

ตารางใช้ยาระงับปวด Fentanyl patch.....mg. จำนวน.....แผ่น แปะผิวหนังทุก.....ชม.

ชื่อ-นามสกุล ผู้ป่วย.....HN.....

ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลพัทลุง
ภายใน 074-609500 ต่อ 1274,1282
มือถือ 086-2874662, 081-1892959, 081-7283404


จันทร์/...../.....	พฤหัสบดี/...../.....	อาทิตย์/...../.....	พุธ/...../.....
เสาร์/...../.....	อังคาร/...../.....	ศุกร์/...../.....	จันทร์/...../.....
พฤหัสบดี/...../.....	อาทิตย์/...../.....	พุธ/...../.....	เสาร์/...../.....
อังคาร/...../.....	ศุกร์/...../.....	จันทร์/...../.....	พฤหัสบดี/...../.....
อาทิตย์/...../.....	พุธ/...../.....	เสาร์/...../.....	อังคาร/...../.....
ศุกร์/...../.....	จันทร์/...../.....	พฤหัสบดี/...../.....	อาทิตย์/...../.....
พุธ/...../.....	เสาร์/...../.....	อังคาร/...../.....	ศุกร์/...../.....
จันทร์/...../.....	พฤหัสบดี/...../.....	อาทิตย์/...../.....	พุธ/...../.....
เสาร์/...../.....	อังคาร/...../.....	ศุกร์/...../.....	จันทร์/...../.....
พฤหัสบดี/...../.....	อาทิตย์/...../.....	พุธ/...../.....	เสาร์/...../.....

***หลังจากจับแผ่นยาหรือลอกแผ่นยาแล้ว ควรล้างมือด้วยน้ำสะอาดเท่านั้น
***แผ่นยาที่ใช้แล้วให้ประกบครึ่งโดยให้ด้านที่มีกาวติดกันก่อนนำไปทิ้ง
ให้เหมาะสม ส่วนยาที่ไม่ได้ใช้ควรนำส่งคืนได้ที่ ศูนย์เคมีบำบัดหรือ
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองโรงพยาบาลพัทลุง


คำแนะนำ
เพิ่มเติม



- 1) ควรแปะยาบริเวณผิวหนังที่ไม่มีการระคายเคืองและถูกฉายรังสี บริเวณที่เหมาะสมที่สุดคือ บริเวณทรวงอกลำตัว หรือต้นแขนด้านบน
- 2) ควรเลือกแปะบริเวณที่ไม่มีขน หรือถ้าจำเป็นต้องแปะให้ใช้กรรไกรเล็ม ขนออก ไม่ควรใช้มีดโกน
- 3) ควรทำความสะอาดบริเวณที่จะแปะยาก่อนด้วยน้ำสะอาดเท่านั้น ไม่ควรใช้สบู่ และรอให้แห้งสนิทจึงแปะแผ่นยา
- 4) ควรตรวจสอบแผ่นยาก่อนใช้ว่ามีการถูกตัดแบ่งหรือมีการชำรุดฉีกขาด ก่อนใช้ทุกครั้ง
- 5) แผ่นยาที่ใช้เสร็จให้ลอกออก แล้วเอาด้านที่เป็นกาวประกบเข้าหากัน และนำไปทิ้งให้เหมาะสม แล้วล้างมือด้วยน้ำสะอาด
- 6) หากแผ่นยาหลุดออกมาก่อนเวลาเปลี่ยนแผ่น ให้ทิ้งแผ่นยานั้นไป และนำแผ่นยาแผ่นใหม่มาแปะที่ผิวหนังบริเวณอื่น
- 7) เก็บในซองยาเดิมและเก็บให้พ้นมือเด็ก



วิธีการแปะแผ่นยา



1. แกะแผ่นยาออกจากซอง โดยให้แกะตามรอยปรุ(ตามลูกศรชี้)



2. แผ่นยาเป็นทานิล



3. บนแผ่นจะมีรอยแยกอยู่ให้ลอก แผ่นที่ปิดอยู่ออก โดยห้ามสัมผัสกับกาว



4. แปะแผ่นยาบริเวณทรงอก ลำตัวหรือแขนด้านบน แล้วใช้มือกดเบาๆไว้ 30 วินาที เพื่อให้แผ่นยาคิดแน่น



5. เมื่อแปะเสร็จแล้วให้ล้างมือด้วยน้ำสะอาด

เมื่อลอกแผ่นแปะเป็นทานิลออก ระดับยาในเลือดจะเหลือครึ่งหนึ่งโดยใช้เวลาประมาณ 17 ชั่วโมง

⊗ คำเตือน ข้อห้ามใช้ ⊗

- 1) ไม่ควรวางกระเป๋าน้ำร้อน ขวดน้ำร้อน บริเวณที่แปะแผ่นยา และไม่ควรรอบไอน้ำหรือแช่อ่างน้ำอุ่น เพราะจะทำให้การปลดปล่อยตัวยาเร็วขึ้น ซึ่งอาจทำให้ได้รับยาในขนาดที่สูงเกิน
- 2) ห้ามดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ เพราะจะทำให้กกระบบประสาท และกดการหายใจได้
- 3) ห้ามใช้ในผู้ที่แพ้ยานี้
- 4) ผู้ที่ใช้ยานี้ติดต่อกันมาเป็นเวลานานไม่ควรหยุดยาเองโดยทันที หากต้องการหยุดใช้ให้ปรึกษาแพทย์
- 5) ยาอาจทำให้เกิดอาการคลื่นไส้ อาเจียน มึนงง เบื่ออาหาร ในช่วงแรก และอาจทำให้เกิดอาการท้องผูก ความดันต่ำ หัวใจเต้นช้าลง

หากมีอาการร่งวงซึมมาก การรับรู้ผิดปกติ

หัวใจเต้นช้าหายใจลำบาก

คลื่นไส้ อาเจียนรุนแรง

ควรปรึกษาแพทย์

*****ห้ามใช้กรณีพบแผ่นยาชำรุด*****

*****และ ห้ามตัด แบ่ง แผ่นยา*****