

แนวทางปฏิบัติกรณีผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาชนิดควบคุมพิเศษ (CRE, VRE, CRAB, CRPA)

ตำแหน่ง	หน้าที่รับผิดชอบ
หัวหน้าเวร	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. รายงานแพทย์</li> <li>2. สั่งการแยกผู้ป่วยเข้าห้องแยก หรือ จัดผู้ป่วยแยกไว้มุมใดมุมหนึ่งของหอผู้ป่วย</li> <li>3. ติดสติ๊กเกอร์เชื้อดื้อยาหน้า chart / แบบติดตามแนวทางปฏิบัติ+ผล Lab</li> <li>4. เบิก 4% chlorhexidine ฟอกตัววันละครั้ง x 5 วัน จากนั้นสัปดาห์ละครั้ง</li> <li>5. เบิกอาหารผู้ป่วยให้ระบุ “ แยกภาชนะ ”</li> <li>6. แจ้งพยาบาลควบคุมการติดเชื้อ (7273) หรือไลน์กลุ่ม “ Cop IC PTL ”</li> <li>7. แจ้งข้อมูลเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกรณีเคลื่อนย้ายผู้ป่วย/ย้ายเตียง (เปล เอกซเรย์ กายภาพ ห้องผ่าตัด พยาบาล ฯลฯ)</li> <li>8. กรณี Refer รพช. แจ้งแพทย์บันทึกในใบส่งต่อ ประสานพยาบาลรพ.ที่รับ refer พร้อมบันทึกแบบฟอร์มส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาชนิดควบคุมพิเศษ</li> <li>9. กรณีส่งต่อ HHC บันทึกในใบส่งต่อ HHC พร้อมแบบฟอร์มส่งต่อผู้ป่วยติดเชื้อดื้อยาชนิดควบคุมพิเศษ</li> </ol>
พยาบาลดูแลผู้ป่วย	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ให้ข้อมูลแก่ผู้ป่วยและญาติ</li> <li>2. สัมภาษณ์ผู้ป่วยที่เป็น contact case .....</li> <li>3. เก็บ rectal swab ในผู้ป่วยและเตียงใกล้เคียง (กรณีพบเชื้อ CRE, VRE)</li> <li>4. ตรวจสอบการปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดของแต่ละตำแหน่ง</li> <li>5. บันทึกทางการพยาบาล</li> </ol>
ผู้ช่วยพยาบาล/ พนักงานช่วยเหลือคนไข้	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. ติดป้าย Contact precautions บริเวณหัวเตียง หรือหน้าห้อง</li> <li>2. แขนว alcohol based hand rub ปลายเตียง</li> <li>3. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันร่างกาย (ใช้ครั้งเดียวทิ้ง) ถุงมือ เอี๊ยมพลาสติก กาวนพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง หรือเสื้อฝน</li> <li>4. แยกอุปกรณ์ของใช้ (ปรอทวัดไข้, cuff BP, Stethoscope)</li> <li>5. ฟอกตัวผู้ป่วยด้วย 4% chlorhexidine วันละครั้ง x 5 วัน (ตั้งแต่คอลงมา)</li> <li>6. ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้และสิ่งแวดล้อมผู้ป่วย ด้วย 0.5% Sodium hypochlorite อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง</li> <li>7. กรณีมีถุง feed อาหาร หลังล้างเบื้องต้นให้เก็บใส่ถุงแยกส่งจ่ายกลาง</li> <li>8. จัดเตรียมถุงแดงสำหรับใส่เสื้อผ้า/เครื่องใช้แล้วผู้ป่วย</li> </ol>
พนักงานทั่วไป	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เตรียมถังใส่ผ้าเปื้อน / ถังขยะติดเชื้อ</li> <li>2. รวบรวมถุงแดงที่ใส่ผ้าใช้แล้ว ระบุข้างถุง “ผ้าติดเชื้อ”</li> <li>3. ทำความสะอาดพื้น อย่างน้อยวันครั้ง (ถูลำดับสุดท้าย)</li> <li>4. จัดเก็บผ้ามาขนส่งซักเมื่อผู้ป่วยจำหน่าย</li> </ol>

ติดสติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วย