

แบบติดตามผลการเพาะเชื้อในผู้ป่วยที่พบเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ (CRE / VRE)

วันที่ Admit หอผู้ป่วย..... รับย้ายวันที่ จากหอผู้ป่วย.....
 รับย้ายวันที่ จากหอผู้ป่วย..... Index case Contact case
 วันที่พบเชื้อดื้อยาครั้งแรก CRE VRE
 Specimen Sputum Urine Pus Fluid จาก..... อื่นๆ
 พบเชื้อ

| ประเภทผู้ป่วย | Clinical specimen culture | Stool culture |
|--|--|--|
| Index Case (ผู้ป่วยที่พบเชื้อ CRE/VRE ใน Clinical specimen ได้แก่ Sputum, Urine, Pus, Fluid จากอวัยวะต่างๆ) | * ติดตาม Lab ครั้งที่ 1 เก็บห่างจากครั้งแรกที่พบเชื้อ 7 วัน วันที่..... ผล C/S ครั้งที่ 2 เก็บห่างจากครั้งที่ 1 14 วัน วันที่..... ผล C/S ครั้งที่ 3 เก็บห่างจากครั้งที่ 2 30 วัน วันที่..... ผล C/S * กรณียังพบเชื้อให้เฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน นับจากครั้งแรกที่พบเชื้อ (ห่างกัน 30 วัน) * กรณีไม่พบเชื้อให้เก็บซ้ำ 2 ครั้งติดต่อกัน (ห่างกัน 7 วัน) ครั้งที่ 1 เก็บห่าง 7 วัน วันที่..... ผล C/S ครั้งที่ 2 เก็บห่างจากครั้งที่ 1 7 วัน วันที่..... ผล C/S | ** ให้เก็บ Rectal swab ในวันแรกที่พบเชื้อ วันที่..... ผล C/S ** กรณีไม่พบเชื้อให้เก็บซ้ำ 3 ครั้งติดต่อกัน (ห่างกัน 7 วัน) ** กรณีพบเชื้อไม่ต้องเก็บต่อ ให้เก็บอีกครั้งเมื่อผล clinical specimen ไม่พบเชื้อ โดยให้เก็บ 3 ครั้งติดต่อกัน (ห่างกัน 7 วัน) ครั้งที่ 1 เก็บห่าง 7 วัน วันที่..... ผล C/S ครั้งที่ 2 เก็บห่างจากครั้งที่ 1 7 วัน วันที่..... ผล C/S ครั้งที่ 3 เก็บห่างจากครั้งที่ 2 7 วัน วันที่..... ผล C/S ** กรณียังพบเชื้อให้เฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 6 เดือน (ห่างกัน 30 วัน) |
| Contact case (ผู้ป่วยที่อยู่เตียง lock เดียวกับ Index case อย่างน้อย 5 วัน) | (Blank) | ครั้งที่ 1 วันแรกที่พบเชื้อ ให้ทำ rectal swab วันที่..... ผล C/S **กรณีพบเชื้อให้ปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา (Contact precautions)** ครั้งที่ 2 ก่อนจำหน่าย เพื่อเฝ้าระวังและติดตามเมื่อมาเข้ารับการรักษาครั้งต่อไป วันที่..... ผลเพาะเชื้อ..... |

หมายเหตุ การเลิกแยกผู้ป่วย เมื่อ 1) ไม่มีอาการของการติดเชื้อ / ได้รับยาต้านจุลชีพครบตามกำหนด
 2) ไม่พบการติดเชื้อใน Specimen 2 ครั้งติดต่อกัน (ห่างกัน 7 วัน)
 3) ผลตรวจ Rectal swab ไม่พบเชื้อ 3 ครั้งติดต่อกัน (ห่างกัน 7 วัน)

ติดสติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วย

แบบติดตามผลการเพาะเชื้อในผู้ป่วยที่พบเชื้อดื้อยาควบคุมพิเศษ (CRAB / CRPA)

วันที่ Admit หอผู้ป่วย..... รับย้ายวันที่ จากหอผู้ป่วย.....
 รับย้ายวันที่จากหอผู้ป่วย..... Index case
 วันที่พบเชื้อดื้อยาครั้งแรก CRAB CRPA
 Specimen Sputum Urine Pus Fluid จาก..... อื่นๆ
 พบเชื้อ

| Index Case | Clinical specimen culture |
|---|---|
| ผู้ป่วยที่พบเชื้อใน Clinical specimen ได้แก่ Sputum, Urine, Pus, Fluid จากอวัยวะต่างๆ | <p>* ติดตาม Lab</p> <p>ครั้งที่ 1 เก็บส่งตรวจห่างจากครั้งที่พบเชื้อ 7 วัน วันที่..... ผล C/S</p> <p>ครั้งที่ 2 เก็บส่งตรวจห่างจากครั้งที่ 1 14 วัน วันที่..... ผล C/S</p> <p>ครั้งที่ 3 เก็บส่งตรวจห่างจากครั้งที่ 2 30 วัน วันที่..... ผล C/S</p> <p>* กรณียังพบเชื้อให้เฝ้าระวังต่อจนครบ 6 เดือน นับจากครั้งที่พบเชื้อ (ห่างกัน 30 วัน)</p> <p>* กรณีไม่พบเชื้อให้เก็บซ้ำ 2 ครั้งติดต่อกัน (ห่างกัน 7 วัน)</p> <p>ครั้งที่ 1 เก็บห่าง 7 วัน วันที่..... ผล C/S</p> <p>ครั้งที่ 2 เก็บห่างจากครั้งที่ 1 7 วัน วันที่..... ผล C/S</p> |

หมายเหตุ * กรณีพบ CRAB / CRPA ไม่ต้องเก็บ Rectal swab *
 การเลิกแยกผู้ป่วย เมื่อ 1) ไม่มีอาการของการติดเชื้อ /ได้รับยาต้านจุลชีพครบตามกำหนด
 2) ไม่พบการติดเชื้อดื้อยาใน Specimen 2 ครั้งติดต่อกัน (ห่างกัน 7 วัน)

ติดสติ๊กเกอร์ชื่อผู้ป่วย

แบบติดตามการเพาะเชื้อ_รพ.พัทลุง_(สิงหาคม 2563)